

Nádory zevního genitálu

Definice

Nádory zevního genitálu zahrnují zhoubný novotvar penisu, šourku a močové trubice. Všeobecně nejsou nádory zevního genitálu v oblasti severní Ameriky a západních zemích tak časté. Přesto mohou mít důležitý dopad na kvalitu života, a proto vyžadují odborný přístup.

Zhoubný novotvar penisu vychází nejčastěji z dlaždicobuněčného epitelu, ačkoliv může zahrnovat i zhoubný novotvar kůže - melanom, sarkom a nádory z bazálních buněk. Různé kožní onemocnění penisu a šourku je potřeba vždy došetřit, zda se jedná o nezhoubný nebo zhoubný nádor.

Šourek může být postižen extramamární Pagetovou chorobou, vyžadující správnou diagnostiku a léčbu.

Zhoubné nádory močové trubice se mohou vyskytovat v souvislosti se zhoubným nádorem močového měchýře, ale mohou být přítomny i samostatně.

Terapie

Podstatou efektivní terapie je včasná diagnostika a správná terapie. Základem terapie je odstranění daného onemocnění s ohledem na zachování močových a sexuálních funkcí.

Diagnostika začíná pohovorem o anamnéze pacienta, dále následuje fyzikální a zobrazovací vyšetření.

Terapie je v rozsahu onemocnění buď lokální zahrnující zachovné operace až po radikální chirurgické řešení s nutnou rekonstrukcí zevního genitálu. Ve vybraných případech je nutná radioterapie a chemoterapie.

Urologové na základě svých zkušeností jsou schopni správně onemocnění diagnostikovat a vybrat nejlepší léčebnou modalitu.