

ŽÁDANKA NA AUTOIMUNITNÍ VYŠETŘENÍ		Laboratorní číslo
Laboratoř alergologie a klinické imunologie, plicní odd., 20. pavilon, tel.: 57 755 2633 Krajská nemocnice T. Bati, a.s., Havlíčkovo nábř. 600, Zlín 762 75 www.kntb.cz/zadanky-imunologie		
Příjem vzorků Po-Pá: 6:30-15:00 hod.		
Pacient (jméno a příjmení):		Diagnóza:
Číslo pojištění:		Pojišťovna:
Datum narození:		Pohlaví: Muž ☐ / Žena ☐
Primární vzorek:		☐ srážlivá krev (sérum) ☐ likvor (cca 500μL)
Žadatel (lékař):		IČP:
Pracoviště:		Odbornost:
Odběr provedl:	Datum a čas odběru:	Razítko a podpis:
AUTOIMUNITA Systémová onemocnění ☐ ANA IF ☐ ANA titr IF (v případě positivity ANA) ☐ ANA typizace (Mi-2, Ku, nRNP, Sm, SS-A, Ro-52, SS-B, Scl-70, PM-Scl 100, Jo-1, CENP B, PCNA, ds DNA, nukleozomy, histony, ribozomální P-protein, AMA M2, DFS 70) IB ☐ a-dsDNA IF ☐ ENA screen (rekomb. Ro60 (SS-A), Scl-70, Jo-1, Ro52, SS-B (La), nativní Sm, RNP) ☐ anti-C1q ☐ anti-MCV Nespecifické střevní záněty ☐ ANCA IF ☐ ASCA IgA, IgG ELISA Céliakie ☐ EMA IgA IF ☐ EMA IgG IF ☐ a-TTG IgA ☐ a-TTG IgG ☐ a-DGP IgG Autoimunitní hepatopatie ☐ AIH soubor (AMA M2, LKM1, LC1, SLA, F-aktin, gp210, sp100) imunodot Antifosfolipidový syndrom ☐ anti-cardiolipin IgG ☐ anti-cardiolipin IgM ☐ a-beta-2-glykoprotein IgG, IgM ☐ a-doména 1 beta-2-glykoprotein IgG ☐ Anti-Phospholipid Screen IgG, IgM ☐ Anti-Phosphatidyl Serine IgG, IgM ☐ Anti-Phosphatidyl Inositol IgG, IgM ☐ Anti-Phosphatidic Acid IgG, IgM ☐ Anti-Annexin V IgG, IgM ☐ Anti-Prothrombin IgG, IgM Perniciozní anémie ☐ a-parietální buňky žaludku ELISA ☐ a- vnitřní faktor ELISA Nefrologický blok ☐ ANCA IF ☐ ANCA (MPO, PR3) rutina ☐ ANCA (MPO, PR3) STATIM ☐ ANCA typizace (MPO, PR3, laktoferin, elastáza, cathepsin G, BPI, lysozym) ELISA ☐ a-GBM (bazální membrána glomerulů) ELISA rutina ☐ a-GBM ELISA STATIM ☐ a-PLA2R (fosfolipázový receptor A2) IF Neurologický blok ☐ a-neuronální antigeny (Amphiphysin, CV2, PNMA2, Ri, Yo, Hu, recoverin, SOX1, titin, zic4, GAD65, Tr(DNER)) IB ☐ a-gangliosidy IgG IB ☐ a-gangliosidy IgM IB ☐ a-MAG (myelin asoc. glykoprotein) IgM IF ☐ a-Aquaporin 4 IgG IF, a-MOG (myelin oligodendrocytární glykoprotein) IgG IF Biologická léčba - Odběr hladiny léčiva je nutný provést těsně před podáním infuze (tzv. trough level). ☐ Infliximab (hladina léku) ☐ a-Infliximab (protilátky proti Infliximabu) ☐ Adalimumab (hladina léku) ☐ a-Adalimumab (protilátky proti Adalimumabu) ☐ Vedolizumab (hladina léku) ☐ a-Vedolizumab (protilátky proti Vedolizumabu) ☐ Ustekinumab (hladina léku) ☐ a-Ustekinumab (protilátky proti Ustekinumabu)		

☐ MBL Manan vázající lektin

Diagnostika heparinem indukované trombocytopenie (HIT)

☐ IgG protilátky proti komplexu heparin-PF4