

Gynekologicko-porodnické oddělení, tel: 577 552 910, fax. 577 552 990

INFORMOVANÝ SOUHLAS S POSKYTNUTÍM ZDRAVOTNÍ PÉČE

Vážená paní,

na základě zhodnocení Vašeho zdravotního stavu je Vám doporučen níže uvedený léčebný postup.

Účelem tohoto záznamu je informovat Vás o Vašem zdravotním stavu, povaze Vašeho onemocnění či zranění, o jeho předpokládaném vývoji (prognóze), o povaze, účelu a průběhu provádění doporučeného léčebného postupu a poskytnout Vám další informace nutné k Vašemu svobodnému a informovanému rozhodnutí, zda k provedení navrženého léčebného postupu udělíte souhlas.

Informace o pacientce:

Pacientka: _____

Jméno, příjmení, datum narození

Zákonný zástupce (zákonní zástupci): _____

Jméno, příjmení, datum narození, bydliště, vztah k pacientce, způsob prokázání zákonného zastoupení

Před podáním informací byla pacientka (její zákonný zástupce) poučen o možnosti vzdát se podání informace o zdravotním stavu s tím, že (vyplní pacient)

Pacientka byla ošetřujícím lékařem seznámena s údaji o:

- svém zdravotním stavu, navrženém individuálním léčebném postupu a všech jeho změnách,
- příčině a původu nemoci, jsou-li známy, jejím stadiu a předpokládaném vývoji,
- jiných možnostech poskytnutí zdravotních služeb, jejich vhodnosti, přínosech a rizicích pro pacientku,
- další potřebné léčbě,
- omezeních a doporučeních ve způsobu života a v ní schopnosti, popř. zdravotní způsobilosti,
- léčebném režimu a preventivních opatřeních, která jsou vhodná a o poskytování dalších zdravotních služeb,
- ekonomicky náročnější variantě poskytnutí zdravotních služeb.

Účel, povaha, předpokládaný přínos, možné důsledky a rizika navrhovaných zdravotních služeb včetně jednotlivých zdravotních výkonů:

PREINDUKCE PORODU, INDUKCE PORODU, PROGRAMOVANÝ POROD

Indukce porodu je umělé vyvolání děložní činnosti za účelem ukončení těhotenství.

Porod se indukuje v případech, kdy další pokračování těhotenství zvyšuje riziko poškození matky a /nebo plodu. Indukce včasným ukončením těhotenství toto riziko významně snižuje, patří tedy k metodám preventivním.

V závislosti na lokálním nálezu a po komplexním zhodnocení rizikových faktorů je užitá konkrétní metoda indukce porodu.

Definice:

Indukce porodu - vyvolání děložních kontrakcí u těhotné ženy, u které dosud neprobíhá porod, s cílem dosáhnout vaginálního porodu.

Programovaný porod - indukce porodu bez medicínské indikace na straně plodu či matky, důvodem je přání matky ukončit termínové těhotenství.

Preindukce porodu - použití farmakologických (prostaglandiny ve formě tablet či gelu, nebo jiných metod) např. cervikální dilatátory Dilapan za účelem přípravy děložního hrdla před indukcí porodu při nepříznivém vaginálním nálezu

Indikace k ukončení gravidity:

- potermínová gravidita - více jak 41 týdnů (41+0 - 42+0),
- preeklampsie od 37. týdne,
- závažné onemocnění matky bez odezvy na léčbu,
- podezření na chorioamnionitidu (zánětlivé onemocnění plodového vejce),
- podezření na hypoxii plodu,
- termínový předčasný odtok plodové vody u gravidity od 37. týdne,
- termínová gravidita s gestačním diabetem se zvýšeným rizikem,
- termínová gravidita s gestační hypertenzí,
- intrauterinní růstová retardace,
- cholestatická hepatóza ve 37. týdnu,
- termínová gravidita u těhotných ve věku více jak 40 let,
- mrtvý plod,
- intrauterinní úmrtí plodu v anamnéze pacientky.

Kontraindikace k indukcí porodu:

- nepoměr mezi velikostí plodu a pánví pacientky (cefalopelvický nepoměr),
- akutní hypoxie plodu,
- akutní porodnické krvácení,
- placenta praevia, vasa praevia (vcestná placenta, vcestné cévy),
- T- řez na děloze v anamnéze,
- závažná operace na děloze v anamnéze,
- stavy po rekonstrukčních operacích v malé pánvi,
- akutní výsev herpes genitalis,
- nádorové onemocnění hrdla děložního,
- ruptura dělohy v anamnéze,
- alergie na prostaglandiny.

Před zahájením indukce je nutné zhodnotit faktory, které mohou mít vliv na úspěšnost indukce a riziko císařského řezu - počet těhotenství, obezita, věk těhotné, vaginální nález, váhový odhad plodu a ev. diabetes mellitus u těhotné.

Před indukcí je možno provést Hamiltonův hmat, který může k začátku porodu bez provedení indukce. Vede ke snížení počtu těhotenství, které pokračují po 41 týdnu.

Preindukce porodu

Cílem je dosažení zralosti hrdla děložního, používají se **metody farmakologické** (aplikace tablety prostaglandinu do zadní poševní klenby), je vysoce efektivní, ale s možností vyššího výskytu hyperaktivity děložní. **Metoda mechanická – prostředky** zaváděné do hrdla děložního – cervikální dilatátory nebo balónkové katétry (Foleyův katétr). Nejčastěji se používají cervikální dilatátory - tyčinky v počtu 2 - 4 ks na dobu 12 - 24 hodin.

Indukce porodu

Indukce musí mít vedle indikace vždy splněny podmínky indukce - tj, příznivý vaginální nález a nepřítomnost kontraindikací. Lze ji provádět pouze za hospitalizace, zahajuje se v ranních hodinách. Pacientka je přijata na porodní sál a dodržuje běžná doporučení v rámci průběhu porodu.

K indukci porodu lze využít oxytocin nebo preparáty s prostaglandiny, u pacientek s pokročilým nálezem lze využít dirupce vaku blan.

Dirupce vaku blan - ve většině případů nestačí s nástupu pravidelné děložní činnosti a doplňuje se podáním oxytocinu.

Oxytocin - u příznivého vaginálního nálezu vyvolává děložní stahy, je lehce zvýšeno riziko ruptury dělohy proti riziku při nástupu spontánní děložní činnosti.

Prostaglandiny - aplikují se do děložního hrdla do oblasti vnitřní branky ve formě tablety nebo gelu v rozmezí 2 hodin za pečlivého monitorování plodu a pečlivého sledování matky. Mezi výhody použití prostaglandinů proti oxytocinu patří dobrá snášenlivost pacientkami, nižší procento ukončení porodu císařským řezem a menší potřeba posilovat děložní činnost oxytocinem.

Úspěšnost indukce porodu

Za úspěšnou indukci považujeme ukončení těhotenství vaginální cestou do 48 hodin od zahájení indukce porodu, nižší úspěšnost je u pacientek s rizikovými faktory.

Indukci porodu, která je neúspěšná v den zahájení aplikace preparátů, opakujeme druhý den, teprve v případě neúspěšné indukce druhý den ukončujeme těhotenství operační cestou.

Programovaný porod

Za programovaný porod je považováno vyvolání děložní činnosti za účelem ukončení fyziologické gravidity v termínu bez zjevné medicínské indikace.

Indikací je přání těhotné ukončit těhotenství, řídí se stejnými postupy jako v případě indukce porodu.

Programovaný porod na přání matky provádíme po 39+0 týdnu těhotenství a při jednočetném těhotenství, poloze podélné hlavičkou a při příznivém vaginálním nálezem nebyly prokázány žádné negativní důsledky programovaného porodu na stav matky a plodu.

Rizika indukce porodu, preindukce porodu a programovaného porodu:

- může se objevit slabé krvácení z rodidel,
- nežádoucí účinky na podané prostaglandiny u matky (nauzea, zvracení, průjem, horečka, bolest v zádech, alergie - ty jsou u vaginálního podání málo časté), zvýšené kontrakce dělohy, ruptura dělohy,
- nežádoucí účinky na podané prostaglandiny u plodu - porucha srdeční frekvence. Nežádoucím účinkům předcházíme pravidelným monitorováním děložní činnosti a akce srdeční plodu. Nelze ani jednoznačně vyloučit (jako u jiných zdravotních výkonů), že nedojde k závažné změně zdravotního stavu či komplikaci, které by mohly vést k ohrožení zdraví či života rodičky a plodu,
- neúspěch preindukce či indukce porodu - pokud i před opakovaný pokus (druhý den opakovaná indukce) nedochází ke zrání a otevírání porodních cest a nedaří se porod vyvolat, stav je opakovaně hodnocen a může být navrženo operační ukončení těhotenství.

Alternativy indukce a preindukce porodu:

Vyčkávací postup za hospitalizace, může dojít k ohrožení stavu matky i plodu včetně nitroděložního úmrtí plodu pro insuficienci placenty.

Omezení, opatření a doporučení pro následný stav a další poskytování zdrav. služeb:

- omezení viz předchozí indikace a kontraindikace preindukce a indukce porodu,
- provádí se nalačno, za hospitalizace, monitorování plodu, matky,
- na další informace se ptejte svého ošetřující lékaře na porodním sále.

Záznam o poučení pacientky, jež byl implantován zdravotnický prostředek, o poskytnutí podrobné informace o implantovaném zdravotnickém prostředku podle zvláštního právního předpisu (vyplní lékař):

PROHLÁŠENÍ:

Prohlašuji, že jsem byla poučena svobodně se rozhodnout o postupu při poskytování zdravotních služeb, pokud právní předpisy toto právo nevylučují. Dále prohlašuji, že jsem byla příslušným zdravotnickým pracovníkem poučena o možnosti vzdát se podání informace o mém zdravotním stavu a o možnosti určit osoby s právem na informace o mém zdravotním stavu nebo vyslovit zákaz podávání informací o mém zdravotním stavu. Za osoby s právem na informace o mém zdravotním stavu určuji (vyplní pacientka v případě, že nevyplňuje souhlas s hospitalizací)

Vyslovuji zákaz podávání informací o mém zdravotním stavu

Zároveň prohlašuji a svým dále uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že lékař, který mi poskytl poučení o mém zdravotním stavu, navrženém léčebném postupu a potřebných jednotlivých zdravotních výkonech, alternativách, rizicích i případných omezeních, mi osobně vysvětlil vše, co je obsahem tohoto záznamu o informovaném souhlasu a jeho příloh a měla jsem možnost klást lékaři otázky, na které úplně, řádně a srozumitelně odpověděl.

Dále prohlašuji, že jsem shora uvedenému poučení plně porozuměla a

SOUHLASÍM – NESOUHLASÍM

s provedením navrženého a popsaného léčebného postupu a jednotlivými zdravotními výkony.

Zároveň jsem poučena o tom, že mohu udělený souhlas odvolat.

Současně prohlašuji, že v případě výskytu neočekávaných komplikací, vyžadujících neodkladné provedení dalších zákroků nutných k záchraně mého života nebo zdraví souhlasím s tím, aby byly provedeny veškeré další potřebné a neodkladné zdravotní výkony nutné k záchraně mého života nebo zdraví, nepůjde-li o výkony, s nimiž výslovně nebudu souhlasit a o nichž sepiši negativní reverz.

Nezletilá pacientka (pacientka s omezenou svéprávností) k poskytnutí zdravotní služby vyslovila svůj názor

..... (vyplní lékař).

Názor nezletilé pacientky (pacientky s omezenou svéprávností) k poskytnutí zdravotní služby nemohl být

zjištěn z důvodu (vyplní lékař).

Ve Zlíně dne..... hodina.....

Vlastnoruční podpis pacientky (případně zákonného zástupce /zákonných zástupců/)

Titul, jméno, příjmení a podpis lékaře, který poučení provedl

Titul, jméno, příjmení a podpis dalšího zdravotnického pracovníka v případě, že pacientka nemůže s ohledem na svůj zdravotní stav záznam o informovaném souhlasu podepsat, včetně důvodů a způsobu, jakým pacientka projevila svou vůli a důvodů bránících pacientce ve vyjádření své vůle požadovaným způsobem.

Vezměte, prosím, tento tiskopis s sebou ke zdravotnímu výkonu spolu s dokumentací.